

LEVODROG®

Solución Oral



### Composición

LEVOFLOXACINA 0 g

### Indicaciones

Indicado para las siguientes enfermedades :Mycoplasmosis, E.R.C., síndromes respiratorios, coriza infecciosa, ORT, pasteurelisis, colibacilosis, septicemia, estreptococosis y estafilococosis.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y Porcinos: Dosis pulso: 100 mg de LEVODROG® / kg p.v. durante 2 a 3 horas en el día, durante 3 a 5 días según gravedad. Dosis continua: 1 mL de LEVODROG®/ litro de agua de bebida constante o 1 mL de LEVODROG® / 10 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días.  
PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 7 días Pavos: 10 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 200 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/levodrog/>

Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE