

LINCODROG C

Solución Oral



Composición

Colistina, sulfato 5 g
Lincomicina, clorhidrato 11 g

Indicaciones

Actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativos, anaerobios y micoplasmas. Aves: acción predominante sobre *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Pseudomona aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium* spp., especies de *Klebsiella*, especies de *Aerobacter*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pasteurella multocida* y *Salmonella* spp. Porcinos: Control y tratamiento de disentería porcina causada por *Serpulina hyodisenteriae* y para la prevención y tratamiento de enteritis bacterianas. Ayuda también en el incremento de la ganancia de peso y mejora la eficiencia alimentaria.

Dosis

Aves y Porcinos: 1 mL de LINCODROG C / 1 L de agua de bebida constante durante 5 a 7 días o 100 a 200 mg / kg p.v. durante 5 a 7 días en casos severos. PERIODO DE RETIRO Carne y Huevos: 7 días

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.60.32.N.0001

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/lincodrog-c/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE