

LINCODROG-P®

Premix



Composición

Lincomicina, clorhidrato 11 g

Indicaciones

Promotor: Para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimentaria. Tratamiento: En aves tiene acción predominante contra *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus influenzae*, *Clostridium* spp. En porcinos para el control y tratamiento de disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

Dosis

Vía oral en agua de bebida o mezclada con el alimento. Aves y porcinos: Promotor: 200 a 400 g de LINCODROG-P® / tonelada de alimento en forma continua. 100 g a 200 g de LINCODROG-P® / 1000 litros de agua de bebida constante como dosis golpe, durante 7 a 10 días . Tratamiento: 1 a 2 kg de LINCODROG-P® / tonelada de alimento o 1 a 2 kg de LINCODROG-P® / 1000 litros de agua de bebida constante, durante 7 a 10 días, a razón de 100 a 200 mg de LINCODROG-P® / kg p.v. PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 5 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Paises

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/lincodrog-p/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE