

LINCODROG-P-LÍQUIDO®

Solución Oral



Composición

Lincomicina, clorhidrato 11 mL

Indicaciones

Aves: Tiene acción predominante sobre Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Clostridium spp.
Porcinos: Control y tratamiento de disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y porcinos: 1 a 2 mL de LINCODROG-P-Líquido® / litro de agua de bebida constante o 1 a 2 L de LINCODROG-P-Líquido® / 1000 litros de agua constante, durante 3 a 5 días. 100 a 200 mg / kg p.v. por 3 a 5 días a criterio de médico veterinario responsable. PERÍODO DE RETIRO 5 días.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/lincodrog-p-liquido/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE