

LINCODROG-S®

Drogavet

Premix



Composición

Lincomicina, clorhidrato 11 g

Indicaciones

LINCODROG-S® es un antibiótico bacteriostático, efectivo contra bacterias Gram positivas, anaerobios y micoplasmas. Aves: Tiene acción sobre Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Clostridium spp. Porcinos: Tratamiento y control de disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae, neumonía por Mycoplasma hyopneumoniae; y para incrementar la ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia.

Dosis

Vía oral mezclado con el alimento. Aves (Pollos de carne, gallinas y reproductoras): Enteritis necrótica causada por Clostridium welchi y otros microorganismos sensibles: 50 g de LINCODROG-S® / tonelada en forma continua (equivalente a 2.2 g de lincomicina / tonelada). Porcinos: Neumonía causada por Mycoplasma hyopneumoniae: 5 kg de LINCODROG-S® / tonelada durante 3 semanas seguidas (equivalente a 220 g de lincomicina / tonelada). Disentería porcina causada por Serpulina hyodysenteriae: -Tratamiento: 2.5 kg de LINCODROG-S® / tonelada durante 3 semanas seguidas (equivalente a 110 g de lincomicina / tonelada). - Control: 1 kg de LINCODROG-S® / tonelada (equivalente a 44 g de lincomicina / tonelada). Promotor de crecimiento: 500 g de LINCODROG-S® / tonelada de alimento en forma continua (equivalente a 22 g de lincomicina / tonelada). PERIODO DE RETIRO Carne: 6 días. Huevo: 48 horas.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/lincodrog-s/>



IMAGEN NO
DISPONIBLE