

NEOMIDROG 50 ®

Premix



Composición

Neomicina, sulfato 50 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de enteritis bacterianas sensibles a la Neomicina, principalmente las causadas por *Escherichia coli* y *Salmonella sp.* Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, disentería vibriónica y enfermedad del edema. Aves: Diarreas inespecíficas y salmonelosis. Vacunos. Ovinos y caprinos: Tratamiento y control de enteritis bacteriana. Cobayos: Salmonelosis.

Dosis

Vía oral en alimento o agua de bebida. - Tratamiento: 30 a 50 mg de NEOMIDROG 50 ® / kg p.v. (equivalente a 300 – 500 g / TM de alimento) o 0.3 a 0.5 g de NEOMIDROG 50 ® / litro de agua de bebida, durante 5 días. - Preventivo: 250 g de NEOMIDROG 50 ® / tonelada de alimento, durante 7 días. PERÍODO DE RETIRO Carne: 4 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1243

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/neomidrog-50/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE