

NORFLAMOX® RP

Premix



Composición

Amoxicilina 15 g
Norfloxacina 12 g

Indicaciones

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas complicadas, micoplasmosis, colibacilosis, salmonelosis y coriza infecciosa.
Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrofica, diarreas infecciosas y otros procesos respiratorios y digestivos de diferentes etiologías.

Dosis

Administrar vía oral, en el alimento. Aves y Porcinos: - Promotor de crecimiento y producción: 300 g de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento en forma continua. - Control de reacciones postvacunales: 500 g de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento, durante 3 a 5 días. - Tratamiento: 1 kg de NORFLAMOX® RP / tonelada de alimento durante 7 a 10 días.
PERIODO DE RETIRO Aves: 5 días. Porcinos: 15 días No usar en animales productores de huevo para consumo humano.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.70.N.1744

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/norflamox-rp/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE