

NORFLYN 20%

Solución Oral



Composición

Norfloxacina 20 g

Indicaciones

Indicado en aves y porcinos para el tratamiento y control de infecciones causadas por *Mycoplasma* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. Aves (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos): brotes moderados de enfermedad crónica respiratoria. Porcinos: infecciones del tracto urinario inferior (cistitis, uretritis, prostatitis aguda y crónica) y superior (pielonefritis), infecciones del aparato genital y uretritis gonocócica no complicada.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves (Pollos, gallinas y pavos): Tratamiento y prevención: 60 mL de NORFLYN 20% / 100 litros de agua constante o 1 mL de NORFLYN 20% / 16 kg p.v./día (equivalente a 12 mg de norfloxacina / kg p.v.), durante 3 a 5 días. Porcinos: 0.3 mL de NORFLYN 20% / litro de agua de bebida constante o 1 mL de NORFLYN 20% / 32 kg p.v. / día (Equivalente a 6 mg de norfloxacina / kg p.v.), durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 10 días

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.32.N.1440

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/norflyn-20/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE