

NORFLYN 25%

Solución Oral



### Composición

Norfloxacin 25 g

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones causadas por microorganismos como Mycoplasma sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Escherichia coli, Pseudomona sp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: - 0.5 mL de NORFLYN 25% / litro de agua de bebida constante, o - 1 mL de NORFLYN 25 % / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Porcinos: - 0.25 mL de NORFLYN 25% / litro de agua de bebida constante, o - 1 mL de NORFLYN 25 % / 40 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 10 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/norflyn-25/>

Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE