

NORFLYN 25%

Solución Oral



Composición

Norfloxacina 25 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones causadas por microorganismos como *Mycoplasma* sp., *Haemophilus* sp., *Pasteurella* sp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* sp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: - 0.5 mL de NORFLYN 25% / litro de agua de bebida constante, o - 1 mL de NORFLYN 25 % / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Porcinos: - 0.25 mL de NORFLYN 25% / litro de agua de bebida constante, o - 1 mL de NORFLYN 25 % / 40 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días.
PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 10 días

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/norflyn-25/>