

OXIDROG INY®

Solución Inyectable



Composición

Oxitetraciclina, clorhidrato 5 g

Indicaciones

OXIDROG INY cuyo principio activo es la oxitetraciclina que ha demostrado ser una de las más activas contra bacterias anaerobias y varias facultativas Gram negativas, de acción eficaz contra la mayoría de infecciones bacterianas de los animales. Gram positivos, Gram negativos, micoplasmas, rickettsias, espiroquetas, clamidias y protozoos. Bovinos: En el tratamiento de anaplasmosis, carbunclo bacteriano, carbunclo sintomático, septicemia hemorrágica, neumonías, neumoenteritis, mastitis, leptospirosis, metritis, etc. Porcinos: Neumonías, septicemia hemorrágica, erisipela, metritis, mastitis, etc. Camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos: En la prevención y tratamiento de neumonías, necrobacilosis, mastitis y carbunclo sintomático. Equinos: En el tratamiento de infecciones respiratorias, septicemia hemorrágica, etc. Caninos y felinos: En infecciones de células sanguíneas como erliquiosis; también se indica en leptospirosis, neumonías, bronquitis y peritonitis.

Dosis

Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta (no aplicable en equinos). Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, caprinos, porcinos y equinos: 1 mL / 10 kg /día / 3 a 5 días. Caninos y felinos: 1 mL / 5kg / día.
Intrauterino: - Bovinos, porcinos, caprinos y ovinos: 30 – 50 mL. - Equinos: 10 – 20 mL. PERÍODO DE RETIRO: Leche: 3 a 5 días. Carne: 18 a 21 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.03.01.N.1731

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/oxidrog-iny/>

Drogavet

