

OXIDROG L

Premix



Composición

Lincomicina, clorhidrato 4.4 g
Oxitetraciclina Base 20 g

Indicaciones

Aves (pollos, gallinas, patos, pavos, gallos): Es sumamente útil contra la enfermedad respiratoria crónica causada por Mycoplasma y complicada por la presencia de Escherichia coli. Casos de colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul, síndromes respiratorios, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis. Porcinos, bovinos, ovinos y caprinos: Neumonías bacterianas, septicemia hemorrágica, leptospirosis, anaplasmosis, piroplasmosis, enteritis, difteria, ántrax, prostatitis, brucellosis, pasteurelosis, aborto enzoótico, infecciones del aparato genital, erlichiosis, erisipela, diarreas bacterianas y síndrome metritis mastitis agalactia (SMMA).

Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. Aves (pollos, gallinas, patos, pavos, gallos), porcinos, bovinos, ovinos y caprinos: Promotor de crecimiento: 0.5 kg de OXIDROG L / tonelada de alimento en forma continua (equivalente a 10 mg de oxitetraciclina /kg p.v.) Tratamiento en alimento: 1 - 2 kg de OXIDROG L / tonelada de alimento, durante 7 a 10 días (equivalente a 20 mg de oxitetraciclina /kg p.v.) Tratamiento en agua (Aves y Porcinos): 50 a 100 mg de OXIDROG L / kg p.v. (0.5 a 1 g por litro de agua) durante 3 a 5 días continuos.
PERIODO DE RETIRO Aves: 5 días Porcinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos: 6 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1313

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/oxidrog-l/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE