

## OXIDROG-T

Premix



### Composición

Oxitetraciclina 20 g  
Tilosina, tartrato 5 g

### Indicaciones

Es eficaz contra infecciones causadas por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae, Mycoplasma meleagridis, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

### Dosis

Aves y Porcinos: Tratamiento: Agua de bebida: 200 mg de OXIDROG-T / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días consecutivos o 2 kg de OXIDROG-T / 1 000 litros de agua continua, durante 3 o 5 días (preparación diaria) o a criterio del médico veterinario responsable. Control: En el alimento: 2 kg de OXIDROG-T / tonelada, durante 5 a 7 días. PERÍODO DE RETIRO Aves: 7 días Porcinos: 14 días

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.26.N.1415

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/oxidrog-t/>

Drogavet

