

## SANADROG®

Premix



### Composición

Doxiciclina 10 g  
Lincomicina, clorhidrato 15 g

### Indicaciones

Es eficaz contra infecciones por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

### Dosis

Via oral en el agua o en el alimento. Aves y Porcinos.  
Tratamiento: Agua de bebida: 100 a 200 mg de SANADROG® / kg p.v., por día, durante 5 días consecutivos, o 1 a 2 kg de SANADROG® / 1 000 litros de agua continua, preparación diaria, durante 5 días consecutivos. Dosificación, según gravedad, a criterio del médico veterinario responsable.  
Alimento: 2 kg de SANADROG® / tonelada. Control de *Mycoplasma*: Se recomienda dar la dosis indicada 1 semana por cada mes según sea el caso, a criterio del médico veterinario responsable. PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 5 días

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeutas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sanadrog/>

Drogavet

