

SANADROG®

Premix



Composición

Doxiciclina 10 g
Lincomicina, clorhidrato 15 g

Indicaciones

Es eficaz contra infecciones por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar y clostridiosis.

Dosis

Vía oral en el agua o en el alimento. Aves y Porcinos.

Tratamiento: Agua de bebida: 100 a 200 mg de SANADROG ® / kg p.v., por día, durante 5 días consecutivos, o 1 a 2 kg de SANADROG ® / 1 000 litros de agua continua, preparación diaria, durante 5 días consecutivos. Dosificación, según gravedad, a criterio del médico veterinario responsable.

Alimento: 2 kg de SANADROG ® / tonelada. Control de Mycoplasma: Se recomienda dar la dosis indicada 1 semana por cada mes según sea el caso, a criterio del médico veterinario responsable. PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 5 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Paises

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sanadro/>

Drogavet

