

SANADROG® S.O.

Solución Oral



### Composición

DOXICICLINA, CLORHIDRATO 15 g  
Lincomicina, clorhidrato 10 g

### Indicaciones

SANADROG® S.O. está indicado en aves y porcinos. - Aves: Tratamiento de la Enfermedad Crónica Respiratoria (*Mycoplasma gallisepticum*) y en infecciones causadas por *Mycoplasma Sinoviae* complicada por la presencia de *Escherichia coli*. En infecciones respiratorias producidas por Cólera aviar (*Pasteurella multocida*), Coriza infecciosa (*Avibacterium paragallinarum*) y en la coriza de los pavos (*Bordetella avium*). Además en enteritis causada por *Clostridium sp.* - Porcinos: Tratamiento de Rinitis Atrófica causada por *Pasteurella multocida* y *Bordetella bronchiseptica* así como en bronconeumonías originadas por *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* y *Mycoplasma hyorhinis*. En casos de pleuropneumonia por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y Enteritis proliferativa porcina (*Lawsonia intracellularis*).

### Dosis

Administrar vía oral en el agua de bebida. - Tratamiento: 1 litro de SANADROG® S.O. por 1000 litros de agua, durante 5 días; o 0.1 mL de SANADROG® S.O. / kg p.v. por día, durante 5 días. - Control de Micoplasma: Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante 1 semana por mes, a criterio del médico veterinario responsable. PERIODO DE RETIRO Aves: 5 días Porcinos: 8 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.32.N.1717

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeutas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sanadrog-s-o/>

Drogavet

