

## SULFADIT®

Premix



### Composición

Sulfadiazina 20 g  
Sulfadimetoxina 20 g  
Sulfamonometoxina 40 g  
Trimetoprim 20 g

### Indicaciones

Indicado para aves (pollos, gallinas, pavos): Cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, enfermedades respiratorias crónicas, coriza infecciosa coccidiosis y coliseptisemia.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. Promotor de crecimiento: 30 g SULFADIT® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días. Dosis Terapéutica: En el agua: 50 g SULFADIT® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días. En el alimento: 300 - 400 g SULFADIT® / tonelada, durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves de carne: 10 días. No administrar en animales productores de huevo para consumo humano. Aves, porcinos y bovinos: 10 días. No administrar a animales productores de leche ni huevo para consumo humano.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.20.N.1411

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfadit/>

Drogavet

