

SULFADIT®

Premix



Composición

Sulfadiazina 20 g
Sulfadimetoxina 20 g
Sulfamonometoxina 40 g
Trimetoprim 20 g

Indicaciones

Indicado para aves (pollos, gallinas, pavos): Cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, enfermedades respiratorias crónicas, coriza infecciosa coccidiosis y coliseptisemia.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. Promotor de crecimiento: 30 g SULFADIT ® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días. Dosis Terapéutica: En el agua: 50 g SULFADIT ® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días. En el alimento: 300 - 400 g SULFADIT ® / tonelada, durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves de carne: 10 días. No administrar en animales productores de huevo para consumo humano. Aves, porcinos y bovinos: 10 días. No administrar a animales productores de leche ni huevo para consumo humano.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1411

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfadit/>

Drogavet

