

## SULFADIT C®

### Premix



### Composición

Sulfacloropiridacina 20 g  
Sulfadimetoxina 60 g  
Trimetoprim 20 g

### Indicaciones

Aves (pollos, gallinas, pavos): Síndrome de cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, enfermedad respiratoria crónica (E.R.C.), coriza infecciosa, coccidiosis y colisepticemia.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. 30 a 40 mg de SULFADIT C®/ kg p.v., por día o 75 a 100 g SULFADIT C®/ 200 litros de agua, durante 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves de carne: 10 días. No administrar en animales productores de huevo para consumo humano. Aves, porcinos y bovinos: 10 días. No administrar a animales productores de leche ni huevo para consumo humano.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Saco 10 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.20.N.1411

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfadit-c/>

## Drogavet

