

SULFADIT D®

Premix



Composición

Sulfadimetoxina 80 g
Trimetoprim 20 g

Indicaciones

Aves: Cabeza hinchada, cólera aviar, tífosis aviar, enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, coccidiosis y colisepticemia. Bovinos: Colibacilosis, coccidiosis y neumonía bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, toxoplasmosis y rinitis atrófica.

Dosis

Administrar por vía oral en el agua de bebida o en el alimento. Promotor de crecimiento: 30 g SULFADIT D® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días o 20 mg SULFADIT D® / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días. Terapéutico: En el agua: 50 g SULFADIT D® / 200 litros de agua durante 3 a 5 días o 30 mg SULFADIT D® / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días. En el alimento: 300 a 400 g SULFADIT D® / tonelada, durante 5 a 7 días o 30 mg SULFADIT D® / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Bovinos y aves: 10 días Porcinos: 15 días No administrar en animales productores de huevos y leche para consumo humano.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1409

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfadit-d/>

Drogavet

