

SULFAQUIN-T

Premix



Composición

Sulfaquinoxalina 80 mg
Trimetoprim 20 mg

Indicaciones

Aves: Coriza infecciosa, coccidiosis, cólera, sinovitis infecciosa, salmonelosis, cresta azul, colibacilosis, estreptococosis y estafilococosis. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Coccidiosis, septicemia hemorrágica, neumonías bacterianas y diarreas bacterianas. Porcinos: Coccidiosis, septicemia hemorrágica, pasteurelosis y neumonías bacterianas secundarias asociadas a influenza. Equinos: Coccidiosis, gurma (moquillo) del potrillo, septicemia hemorrágica, neumonías bacterianas y diarreas bacterianas.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Aves (pollos y pavos): 50 a 70 g de SULFAQUIN-T / 200 litros de agua o 500 a 700 g de SULFAQUIN-T / tonelada de alimento, durante 3 días. Suspender 2 días y repetir el tratamiento según evaluación del médico veterinario. Porcinos: 50 a 70 g de SULFAQUIN-T / 200 litros de agua o 500 a 700 g de SULFAQUIN-T / tonelada de alimento, durante 5 días. Conejos: 4 a 5 g de SULFAQUIN-T / litro de agua durante 3 días, suspender durante 2 días y repetir el tratamiento según evaluación del médico veterinario. Terneros: 15 a 20 g de SULFAQUIN-T / 100 litros de agua durante 5 días. PERIODO DE RETIRO 10 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.64.26.N.0045

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfaquin-t/>

Drogavet

