

## SULFATRIM T

### Premix



### Composición

Sulfadimetoxina 40 g  
Sulfametoxazol 40 g  
Trimetoprim 20 g

### Indicaciones

Aves: Coriza infecciosa, coccidiosis, cólera, sinovitis infecciosa, salmonelosis, cresta azul, colibacilosis, estreptococosis y estafilococosis. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Coccidiosis, septicemia hemorrágica, neumonías bacterianas y diarreas bacterianas. Porcinos: Coccidiosis, septicemia hemorrágica, pasteurelisis y neumonías bacterianas secundarias asociadas a influenza. Equinos: Coccidiosis, gurma (moquillo) del potrillo, septicemia hemorrágica, neumonías bacterianas y diarreas bacterianas.

### Dosis

Vía oral mezclado con el alimento. Preventivo: 300 g de SULFATRIM T / tonelada de alimento, durante 3 a 5 días. Tratamiento: 400 - 500 g de SULFATRIM T / tonelada de alimento o 30 a 40 mg de SULFATRIM T / kg p.v., durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves: 10 días. Porcinos: 15 días. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 10 días. No administrar a animales en producción de leche ó huevos para consumo humano.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.20.N.1410

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfatrim-t/>

Drogavet

