

## TIAMUDROG®

Premix



### Composición

Tiamulina, fumarato hidrogenado 20 g

### Indicaciones

Infecciones por Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, M. hyopneumoniae, Brachyspira hyodysenteriae, Gram positivos: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens, Corinebacterium pyogenes, Gram negativos: Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Escherichia coli. Aves: E.R.C., micoplasma y sinusitis infecciosa en pavos y gallinas. Porcinos: Neumonía enzoótica, pleuroneumonía, poliserositis y disentería porcina.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. AVES: ALIMENTO Promotor: 300 a 400 g de TIAMUDROG® / tonelada, en forma continua. Terapéutico: 1.5 a 2.5 kg de TIAMUDROG® / tonelada, durante 5 a 7 días. AGUA DE BEBIDA Terapéutico: 75 a 125 mg TIAMUDROG® / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. PORCINOS: ALIMENTO Promotor: 150 a 200 g TIAMUDROG® / tonelada, en forma continua. (equivalente a 1.5 a 2 mg del Fumarato hidrogenado de Tiamulina / kg p.v.) Terapéutico: 500 g TIAMUDROG® / tonelada, durante 5 a 7 días. (equivalente a 5 mg del Fumarato hidrogenado de Tiamulina / kg p.v.) PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 7 días.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.20.N.1344

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/tiamudrog/>

Drogavet

