

## TILODROG-L®

### Solución Oral



### Composición

Lincomicina, clorhidrato 20 g  
Tilosina, tartrato 5 g

### Indicaciones

Aves: Tratamiento de infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Haemophilus* spp., *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp., y algunas cepas de *Escherichia coli*. Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrófica, neumonía, disentería porcina; mejora la conversión alimenticia y el incremento de peso.

### Dosis

Aves y porcinos: Tratamiento: 1 litro de TILODROG-L® / 1000 litros de agua de bebida continua, preparación diaria, durante 5 a 7 días. En casos muy severos utilizar 1.5 litro de TILODROG-L® / 1000 litros de agua de bebida constante, durante 5 a 7 días, o 100 mg a 150 mg de TILODROG-L® / kg p.v. Control: Se recomienda dar la dosis tratamiento 1 semana / mes, a criterio del médico veterinario responsable. PERÍODO DE RETIRO 5 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/tilogrog-l/>

## Drogavet

