

TRICLA F

Suspensión Oral



Composición

Triclabendazol 0 mL

Indicaciones

Tratamiento y control de distomatosis hepática (Fasciola hepática) aguda, subaguda y crónica. Su acción se ejerce sobre los estados inmaduros, juveniles y adultos del parásito, así como también en nematodos gastrointestinales, pulmonares y céstodos.

Dosis

Vía oral directa, se puede realizar con cualquier pistola dosificadora. Dosis única cada 8 a 10 semanas en zonas de alta infestación o prevalentes, o cada 5 a 6 semanas en casos agudos y subagudos. Bovinos y equinos: 10 mL de TRICLA F / 100 kg p.v. (eq. a 12 mg de triclabendazol y 10 mg de febendazol por kg / p.v.). Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de TRICLA F / 10 kg p.v. (eq. a 12 mg de triclabendazol y 10 mg de febendazol por kg / p.v.). PERÍODO DE RETIRO Carne y leche: 28 días.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/tricla-f/>

Drogavet

