

## TRICLADROG

### Suspensión Oral



### Composición

Triclabendazol 10000 mg

### Indicaciones

Indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y equinos en el tratamiento y control de Distomatosis hepática (Fasciola hepatica, duela del hígado, alicuya) aguda, subaguda y crónica. Su acción se ejerce sobre los estados inmaduros, juveniles y adultos del parásito.

### Dosis

Vía oral directa, Dosis única cada 8 a 10 semanas en zonas de alta infestación o prevalentes, o cada 5 a 6 semanas en casos agudos y subagudos. Bovinos: 12 mL de TRICLADROG por cada 100 kg p.v. (Equivalente a 12 mg de triclabendazol por kg). Ovinos, caprinos, camélidos y equinos: 1 mL de TRICLADROG por cada 10 kg p.v. (Equivalente a 10 mg de triclabendazol por kg).

PERÍODO DE RETIRO Carne: 28 días antes del sacrificio. Leche: 28 días luego del último tratamiento.

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0871

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/diaerom-plus-copiar/>

## Drogavet

