

ANVER + CO 10 %

Suspensión Oral



Composición

Albendazol 10 g
Cobalto, sulfato 9.75 mg

Indicaciones

Para el control y tratamiento de los parásitos del ganado bovino, causada por gusanos redondos gastrointestinales: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Oesophagostomun*, *Chabertia*, *Bunostomun*, *Strongyloides*, etc. por gusanos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*) por tenias (*Moniezia spp.*) y por parásitos del hígado. ANVER + CO 10 % controla huevecillos, larvas y adultos de los gusanos redondos gastrointestinales y también *Ostertagiasis* Tipo II. Mata también huevecillos, larvas y adultos de los gusanos pulmonares y tenias en Bovinos. ANVER + CO 10 % es altamente eficaz contra las formas adultas y huevecillos de *Fasciola Hepática*. ANVER + CO 10% se debe administrar sólo por vía oral.

Dosis

Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 50 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 2.5 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 3.5 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 5 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 100 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 5.0 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 7.5 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 10 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 200 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 10 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 15 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 20 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 300 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 15 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 22.5 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 30ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 400kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 20 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 30 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 50 ml.

Presentaciones

Frasco 1000 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 30 mL, Sachet 40 mL, Cojín 30 mL, Galonera 3.5 L,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.065

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE

