

ANVER + CO 15 %

Suspensión Oral



Composición

Albendazol 15 g
Cobalto, sulfato 9.75 mg

Indicaciones

Para el control y tratamiento de los parásitos del ganado bovino, causada por gusanos redondos gastrointestinales: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomun, Chabertia, Bunostomun, Strongyloides, etc., por gusanos pulmonares (Dictyocaulus viviparus) por tenias (Moniezia spp.) y por parásitos del hígado(fasciola hepática). Anver + Co 15 % controla huevecillos, larvas y adultos de los gusanos redondos gastrointestinales y también Ostertagiosis Tipo II .Mata también huevecillos, larvas y adultos de los gusanos pulmonares y tenias en Bovinos. Anver + Co 15 % es altamente eficaz contra las formas adultas y huevecillos de Fasciola Hepática. Anver + Co 15 % se debe administrar sólo por vía oral.

Dosis

Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 75 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 2.5 ml, para larvas enquistadas de Ostertagia usar 3.75 ml y para atacar gusanos del hígado (fasciola hepática) usar 5 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 150 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 5.0 ml, para larvas enquistadas de Ostertagia usar 7.5 ml y para atacar gusanos del hígado (fasciola hepática) usar 10 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 225 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 7.5ml, para larvas enquistadas de Ostertagia usar 11.25 ml y para atacar gusanos del hígado (fasciola hepática) usar 15 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 300 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 10 ml, para larvas enquistadas de Ostertagia usar 15 ml y para atacar gusanos del hígado (fasciola hepática) usar 20ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 450kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 15 ml, para larvas enquistadas de Ostertagia usar 22.5 ml y para atacar gusanos del hígado (fasciola hepática) usar 30 ml.

Presentaciones

Frasco 1000 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 30 mL, Sachet 40 mL, Cojín 30 mL, Galonera 3.5 L,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0799

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

LABA

