

## ANVER + CO 15 %

### Suspensión Oral



### Composición

Albendazol 15 g  
Cobalto, sulfato 9.75 mg

### Indicaciones

Para el control y tratamiento de los parásitos del ganado bovino, causada por gusanos redondos gastrointestinales: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Oesophagostomun*, *Chabertia*, *Bunostomun*, *Strongyloides*, etc., por gusanos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*) por tenias (*Moniezia* spp.) y por parásitos del hígado (*fasciola hepática*). Anver + Co 15 % controla huevecillos, larvas y adultos de los gusanos redondos gastrointestinales y también *Ostertagiasis* Tipo II. Mata también huevecillos, larvas y adultos de los gusanos pulmonares y tenias en Bovinos. Anver + Co 15 % es altamente eficaz contra las formas adultas y huevecillos de *Fasciola Hepática*. Anver + Co 15 % se debe administrar sólo por vía oral.

### Dosis

Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 75 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 2.5 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 3.75 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 5 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 150 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 5.0 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 7.5 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 10 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 225 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 7.5ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 11.25 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 15 ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 300 kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 10 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 15 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 20ml. Peso del animal kg de peso vivo: Por cada 450kg, usar para gusanos pulmonares, tenias y gusanos redondos gastrointestinales 15 ml, para larvas enquistadas de *Ostertagia* usar 22.5 ml y para atacar gusanos del hígado (*fasciola hepática*) usar 30 ml.

### Presentaciones

Frasco 1000 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 30 mL, Sachet 40 mL, Cojín 30 mL, Galonera 3.5 L,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0799

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

## LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE

