

## CICLOSAN PLUS

Solución Inyectable



### Composición

Diclofenaco sódico 0.5 g  
Oxitetraciclina 10 g

### Indicaciones

Carbunco bacteridiano, Carbunco sintomático o mancha, Anaplasmosis, Leptospirosis, Actinomicosis, Enteritis bacterianas. Pederas, Mastitis septicémica, Metritis, Infecciones genitourinarias, Neumonía, Bronquitis otras enfermedades respiratorias. Leptospirosis, Erisipela, Diarreas de los lechones, Infecciones post-parto o infecciones post-quirúrgicas, Peritonitis, Pleuresía, Enfermedades virales, Enterotoxemia, Papera Equina, ERC. Coriza, Cólera aviar, Sinusitis infecciosa, Laringotraqueitis, Newcastle.

### Dosis

• Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Porcino, Equinos: 1 ml cada 10 kg de peso vivo. • Especies Menores: 1 ml cada 5 kg de peso vivo. De ser necesario repetir la dosis a las 24 horas.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Intraperitoneal  
Parenteral Intravenoso  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Perú SENASA F.71.01.N.0009

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Analgésicos y antipiréticos  
Antibacterianos (antibióticos)  
Tetracilinas  
Antiinflamatorios  
No esteroideos sistémicos

### Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE

