

CICLOSAN PLUS

Solución Inyectable



Composición

Diclofenaco sódico 0.5 g
Oxitetraciclina 10 g

Indicaciones

Carbunco bacteridiano, Carbunco sintomático o mancha, Anaplasmosis, Leptospirosis, Actinomicosis, Enteritis bacterianas. Pedera, Mastitis septicémica, Metritis, Infecciones genitourinarias, Neumonía, Bronquitis otras enfermedades respiratorias. Leptospirosis, Erisipela, Diarreas de los lechones, Infecciones post-parto o infecciones post-quirúrgicas, Peritonitis, Pleuresía, Enfermedades virales, Enterotoxemia, Papera Equina, ERC. Coriza, Córara aviar, Sinusitis infecciosa, Laringotraqueitis, Newcastle.

Dosis

• Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Porcino, Equinos: 1 ml cada 10 kg de peso vivo. • Especies Menores: 1 ml cada 5 kg de peso vivo. De ser necesario repetir la dosis a las 24 horas.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intraperitoneal
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.71.01.N.0009

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Analgésicos y antipiréticos
Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas
Antiinflamatorios
No esteroidales sistémicos

Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA

