

FORTEVITA-SOLUCIÓN ORAL

Solución Oral



Composición

Calcio pantotenato 500 mg
Colina, cloruro 200 mg
Metionina (DL-Metionina) 2.5 g
Niacinamida 12 g
Tiamina (Vitamina B1) 1 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5500 mcg
Vitamina B2 (Riboflavina) 400 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1 g
VITAMINA C 400 mg

Indicaciones

- Para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas del complejo B.
- Conjuntamente con una fluoroquinolona para el tratamiento de enfermedades infecciosas en aves y cobayos.
- Todos los casos de intoxicaciones alimenticias y medicamentosas.
- En situaciones de anorexias por afecciones infecciosas, como en casos de diarreas neonatales.
- Hepatitis producida por adenovirus y también por micotoxinas, hígado graso.
- Es un excelente coadyuvante en el tratamiento de infecciones hepáticas e intestinales en cobayos, como es en el caso de la Salmonella dublin.
- Strees por el cambio de alimento o ambiente, destete en cobayos, clima adverso, vacunaciones, manejo, etc.
- Retardo en el crecimiento.
- Pobre conversión alimenticia.
- Anemias parasitarias o de cualquier índole.
- Vigorizante o revitalizante.

Dosis

Dosificación: • Bovinos, ovinos, equinos: 1-2 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Terneros y potrillo: 1-2 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Porcinos y camélidos sudamericanos: 1-2 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Caninos y felinos: 1-2 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Cuyes y conejos: 1 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Aves de postura: 2 ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días. • Aves de carne: 1ml/ Litro de agua de bebida, durante 5 a 7 días.

Presentaciones

Galonera 500 mL, Galonera 250 mL, Galonera 1 L,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.75.37.N.0026

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Vitaminas
Asociadas con aminoácidos
Asociadas con minerales

LABA



IMAGEN NO
DISPONIBLE

