

LABAMICINA 200 LA

Solución Inyectable



Composición

Diclofenaco sódico 0.5 g
Oxitetraciclina 20 g

Indicaciones

Es un antibiótico de amplio espectro y antiinflamatorio no esteroideo, antipirético, analgésico, no abortivo de larga acción (72 horas), indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas y negativas (Bacillus anthracis, Clostridium spp, Pausteuella spp, Campylobacter spp, Haemophilus spp, Klebsiella spp, Spherophorus necrophorus, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Actinobacillus spp, Actinomyces bovis, Aerobacter aerogenes, Leptospira Pomona, Moraxella bovis, Erysipelothrix insidiosa, Corynebacterium spp, Listeria spp, Fusiformis necrophorus, Streptococcus spp, Staplylococcus spp), microorganismos de los grupos Chlamydiae, Mycoplasmatacae, Rickettsiae (Anaplasmaspp), Eperythrozoonosis, Hemobartolenosis, Vibrio fetus y algunos hongos (Dermatophilus congolensis) en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

Dosis

LABAMICINA 200 LA se administra por vía Intramuscular, Subcutánea, Intraperitoneal, Intravenosa, Infiltración local e intrauterina a razón de: • Bovinos y porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo en dosis única, pero de ser necesario repetir las dosis a las 72 horas. • Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1ml por cada 10 kg de peso vivo en dosis única, pero de ser necesario repetir las dosis a las 72 horas. • Dosificación intrauterina: de 10 a 20 ml de LABAMICINA 200 LA de preferencia diluido en 20 ml de suero fisiológico, cada 2 días durante 6 días como máximo.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.71.01.N.0025

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Analgésicos y antipiréticos
Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas
Antiinflamatorios
No esteroideos sistémicos

LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE

