

POTENXIN

Premix



Composición

Estreptomicina, sulfato 2 g
Florfenicol 3 g
Oxitetraciclina, clorhidrato 10 g
Vitamina A 300000 U.I.
Vitamina B1 (Tiamina) 300 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 300 mg
VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) 250 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 300 mg
Vitamina C (Ascórbico, ácido) 400 mg
Vitamina E 500 U.I.

Indicaciones

Para cuadros de salmonelosis , leptospirosis , diarreas neonatales, colibacilosis ,cólera aviar ,ERC coriza infecciosa, tifosis ,paratifosis ,bronquitis ,neumonía ,enteritis bacterianas ,disentería vibrionica , viruela y otros.

Dosis

POTENXIN se administra por vía oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Dosis: • Caninos, aves, cuyes y conejos: 1 cápsula de 125 mg o disolver 1 gramo en 1 litro de agua de bebida por animal cada 8 horas, durante 3 a 5 días. • Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 cápsula de 250 mg por cada 10 kg de peso vivo o 1 gramo por cada 40 kg de peso vivo cada 8 horas, durante 3 a 5 días.

Presentaciones

Sobre 100 g, Sobre 10 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.88.49.N.0001

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE



IMAGEN NO DISPONIBLE