

## ROJSIL

Solución Tópica



### Composición

Fenol 0.5 g  
NEOPRONTOSIL 5 g

### Indicaciones

ROJSIL, es eficaz en infecciones de origen estreptocócica y estafilocócica .igualmente demuestra ser altamente eficaz en metritis e infecciones post-parto en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, camélidos sudamericanos y caninos.

### Dosis

Dosificación: Las dosis para uso topical es variable, depende de la magnitud de la lesión. Por vía intrauterina no necesita diluir el producto se debe administrar directamente al animal mediante una pipeta, a razón de: • Bovinos y equinos: 30 – 50 ml. • Ovinos, porcinos y camélidos sudamericanos: 30 – 50 ml. • Caninos: 5-10 ml. • El número de aplicaciones de ROJSIL es de 3 dosis, con intervalos de 72 horas cada uno durante 9 días o hasta la desaparición total de las lesiones.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Topical Dérmico  
Topical Intrauterina

### Países

Perú SENASA F.03.01.N.0685

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

## LABA



IMAGEN NO  
DISPONIBLE

