

RUMELAB

Polvo Soluble



Composición

Calcio, carbonato 32 g
Caolín 12 g
Dimetilpolisiloxano 5 g
Jengibre en polvo 20 g
SAL DE VICHY 25 g
VITRIOLO BLANCO 6 g

Indicaciones

RUMELAB está indicado en el ganado bovino y ovino, para los casos de timpanismo o aventazón, atonía o parálisis del rumen, intoxicaciones ocasionadas por forrajes descompuestos o sustancias tóxicas, como laxante, en cuadros de pérdida del apetito y en casos de sobrecarga alimenticia.

Dosis

RUMELAB está indicado en el ganado bovino y ovino, para los casos de timpanismo o aventazón, atonía o parálisis del rumen, intoxicaciones ocasionadas por forrajes descompuestos o sustancias tóxicas, como laxante, en cuadros de pérdida del apetito y en casos de sobrecarga alimenticia. Dosificación:

- RUMELAB se debe administrar por vía oral, disuelto en el agua de bebida, leche o cualquier sustituto lácteo.
- RUMELAB puede administrarse por sonda o por trocar mezclado el contenido de la dosis en cantidad suficiente de agua o leche.
- Bovinos: • Dosis preventiva: 1-2 cucharadas soperas. • Dosis curativa: 2-4 cucharadas soperas. Ovinos: • Dosis preventiva: ½ - 1 cucharadas soperas. • Dosis curativa: 1-2 cucharadas soperas.

Presentaciones

Sobre 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Agentes De Uso Múltiple
Antiespumantes, antitimpanizantes, antiflatulentos

Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA



IMAGEN NO
DISPONIBLE

