

TRIFEN- 17 %

Suspensión Oral



Composición

Fenbendazole 7 g
Triclabendazol 10 g

Indicaciones

TRIFEN- 17 % está indicado para el control y tratamiento de parasitosis interna en vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos. TRIFEN- 17 % antihelmíntico de amplio espectro ,elimina trematodos (Fasciola hepática ,Fasciola gigántica) en sus tres estadios : Inmaduro joven de 1 a 6 semanas ,inmaduros de 6 a 10 semanas y adultos mayores de 10 semanas ,efectivo 100 %contra fasciolasis aguda, subaguda y crónica. TRIFEN- 17 % elimina nemátodos gastrointestinales,pulmonares y tenias, en todas sus fases infectivas, tiene acción ovicida. TRIFEN- 17 % posee amplio margen de seguridad puede ser administrado en animales de cualquier edad, cualquier fase de gestación y lactancia.

Dosis

Administración por vía oral. Dosificación: 1 ml / 10 kg de peso vivo. Precauciones: • No faenar al animal para consumo humano, dentro de 28 días post al tratamiento, ni consumir la leche ni derivados a los 12 días del último tratamiento. • En hembras gestantes puede dosificarse hasta 7 días antes del parto.

Presentaciones

Frasco 1000 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 30 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0325

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA

