

CIPERPLUS POUR ON

Solución Tópica Pour On



Composición

Cipermetrina 6 g

Indicaciones

CIPERPLUS POUR ON es un ectoparasiticida contra pulgas, piojos, y garrapatas usado en ganado vacuno, ovino y porcino. AGENTES ETIOLÓGICOS SUSCEPTIBLES: Acaros y Garrapatas: • Boophilus microplus (Garrapata común del bovino) • Psoroptes spp. • Sarcoptes scabiei • Melophagus ovinus Moscas y tábanos: • Musca spp. • Haematobia irritans (mosca de los cuernos) • Callitroga hominivorax • Sarcophaga carnaria • Lucilia sericata • Tabanus spp. • Dermatobia hominis Piojos • Damalinae bovis • Damalinae ovis • Bovicola subrostratus • Haematopinus eurysternus • Haematopinus asini • Haematopinus suis Pulgas • Ctenocephalides felis • Ctenocephalides canis

Dosis

Especies de destino: Bovinos: • 100-200 kg p.v. ----- 5 ml. • 201-400 kg p.v -----10 ml. • Más de 400 kg p.v-----20ml. Ovinos y camélidos sudamericanos: • Hasta 120 días post esquila: 5 ml por animal. • Más de 120 días post esquila: 6-7 ml por animal. Porcinos: 5-7.5 ml. Se aplica epicutáneamente (sobre la piel), a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola del animal. PERIODO DE RETIRO: Bovinos: 14 días. Ovinos y porcinos: 7 días. EFECTOS COLATERALES POSIBLES: No a las dosis e indicaciones de uso recomendadas. Pueden aparecer ocasionalmente fenómenos de irritación local, incluyendo prurito, urticaria, edema, eczema. Puede ocurrir erosión corneal leve y edema del estroma. CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: Su uso está contraindicado en animales que presenten daño hepático y discrasia sanguínea.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 30 mL,

Vías Administración

Topical Dérmico

Países

Perú SENASA F.07.62.N.0450

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

<http://www.labodec.com/ciperplus.html>

Labodec

