

## CORRAL 15 MG

Cápsula Oral



### Composición

Albendazol 15 mg

### Indicaciones

Elimina parásitos gastrointestinales, pulmonares y Tenias en aves, canes y felinos. CANES Y FELINOS: NEMATODOS: Spirocerca lupi, Physaloptera, Strongyloides stercoralis, S. cati, Toxacara canis, T. leónica, T. cati, Ancylostoma caninum, A. tubaeformis, A. braziliense, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis. CESTODOS: Dipylidium caninum TREMATODOS: Heterobilharzia americana, platynosomun fastosum. AVES: NEMATODOS: Syngamus trachea, Capillaria spp., Ascaridia spp., Eterakis spp., Strongyloides spp., Trichistrongylus spp., etc. CESTODOS: Tenias, Raillentina spp, Amoebotaenia spp., etc. TREMATODOS: Ciclocoélidos Psilostomidae, Strideidae, Branquilémidos, etc.

### Dosis

DOSIFICACIÓN: GALLOS DE PELEA: 1 Cápsula por 1 solo día. GALLINAS Y POLLOS: 1 Cápsula por 1 solo día. PAVOS: 2 a 3 Cápsulas por 1 solo día. CANES: Cestodos: 1 Cápsula por cada 0.5 kilos de peso, durante 2 a 3 días. Nematodos: 1 Cápsula por cada kilo de peso durante 2 a 3 días. FELINOS: 1 Cápsula por cada kilos de peso durante 2 a 3 días. PERIODOS DE RETIRO: 14 días antes del sacrificio de las aves para consumo humano. CONTRAINDICACIONES: No administrar en animales hipersensibles a los bencimidazoles.

### Presentaciones

Frasco 100 unidad (es),

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)

### Web Site

<http://www.labodec.com/corral15mg.html>

Labodec

