

DOXIMICINA-INYECTABLE

Solución Inyectable



Composición

Doxiciclina 10000 mg

Indicaciones

Indicado en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Doxiciclina, tales como cocos Gram Positivos, entre los cuales están: estafilococos, estreptococos alfa y beta hemolíticos, estreptococos anaeróbicos y neumococos; cocos Gram Negativos como menigcocos y gonococos; bacilos Gram Positivos como Listeria spp., Erysipelothrix spp., Clostridios spp., Corynebacterium spp., y Bacillus spp.; bacilos Gram Negativos como Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Brucilla spp., Vibrio spp., Compylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Bordetella spp., Moraxella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Fusobacterium spp., etc.

Dosis

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: Se aplica por vía intramuscular o intravenosa. Aplique 1 mL por cada 20 kilos de peso corporal. En el caso de lechones administre como mínimo 1 mL, aunque su peso sea inferior a 20 kilos y aplique detrás de la oreja. En aves y cuyes aplique 0.5 mL por kilo de peso vivo por vía intramuscular o subcutánea. Al administrar por la matriz aplique 5 a 25 mL, dependiendo del grado de infección y peso del animal y mediante sonda. Siempre utilice aguja larga y evite inyectar en tejido graso. Si la dosis es superior a 10mL en bovinos y 3 mL en terneros y cerdos, aplique la dosis en dos puntos distintos. **PERÍODO DE RETIRO:** Carne: 7 días. Vísceras: 14 días Leche: 10 días

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso

Paises

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas

Web Site

<http://www.labodec.com/doxi.html#>

Labodec

