

ENRODEC 20 % L.A.

Solución Inyectable



## Composición

Enrofloxacina 20 g

# Indicaciones

ENRODEC-20 L.A. es un antibiótico con acción bactericida de amplio espectro que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Esta indicado para tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales en Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos, conejos, cuyes y aves. Agentes etiológicos susceptibles. Bacterias Gram Positivos y Gram Negativos; Micoplasmatacae, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia Coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Erysipelotrix spp., Fusobacterium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Moraxella .

## Dosis

Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 2.5 mg/Kg p.v. 0.5 mL Enrodec-20 L.A. :40 Kg p.v. Vía De Administración: IM o SC. Intervalo/ Duración:Diaria/ 5 días. Equinos:2.5 mg/Kg p.v. 40 Kg p.v. NOTA: Su uso debe ser sólo cuando sea necesario y en animales adultos, debido a sus posible efectos colaterales Felinos: 5 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :4 Kg p.v. Vía de administración: SC o EV Intervalo / Duración: Cada 24 horas. Conejos: 2.5 - 5 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :4 - 8 Kg p.v. Vía de administración:IM Intervalo / Duración: Diaria/ 3 a 5 días. Cuyes:5 - 20 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :1 - 4 Kg p.v. Vía de administración:IM o SC Intervalo / Duración: Diaria/ 3 –5 días. Aves:15 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :1.4 Kg p.v. Vía de administración: IM Intervalo / Duración: Cada 12 horas. Caninos: 2.5 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :8 Kg p.v. Vía de administración:IM Caninos: 5 mg/Kg p.v. 0.1 ml Enrodec -20 L.A. :4 Kg p.v. Vía de administración:SC o EV Intervalo / Duración:Cada 24 horas. Bovinos:2.5-5 mg/Kg p.v. 1 mL Enrodec-20 L.A.: 40-80 Kg p.v. Vía de administración:SC Intervalo / Duración:Diaria/ 3 a 5 días. Porcinos:2.5-5 mg/Kg p.v. 1 mL Enrodec-20 L.A.:40-80 Kg p.v. Vía de administración:IM Diaria/ 3 a 5 días.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

### Vias Administración

Parenteral Intramuscular Parenteral Intravenoso Parenteral Subcutáneo

#### Paises

Perú SENASA F.03.01.N.1592

Clase ACTVET

## Labodec



