ENRODEC 20 % L.A. + DICLOFENACO

Labodec

Solución Inyectable





Composición

Diclofenaco sódico 3 g
Enrofloxacina 20 g

Indicaciones

ENRODEC 20% LA + DICLOFENACO está indicado para el tratamiento y control de infecciones asociadas a procesos inflamatorios, dolor y/o fiebre en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y caninos. Agentes etiológicos susceptibles: Infecciones del aparato gastrointestinal: -Colibacilosis – E. coli -Salmonelosis – Salmonella spp. -Enteritis – Clostridium perfringens Infecciones del aparato respiratorio: -Broncopulmonia – P. multocida -Pulmonia Enzootica – P. haemolytica, M. bovis, Klebsiella spp, Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes Infecciones del aparato respiratorio: -Broncopulmonia – P. multocida -Pulmonia Enzootica – P. haemolytica, M. bovis, Klebsiella spp, Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes -Pulmonía – Haemophilus spp. Infecciones del aparato urinario: -Colibacilosis – E.coli -Retención de placenta – Corynebacterium spp. Mastitis: -Staphylococcus spp. -Streptococcus spp. -C. Perfringens -Mycoplasma hyopneumoniae -Klebsiella spp.

Dosis

DOSIFICACIÓN: BOVINOS 1-2 mL/80 Kg./ día; vía subcutánea / 3-5 días OVINOS, CAPRINOS 1-2 mL/80 Kg. / día; vía subcutánea o intramuscular CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS: 1 mL/40 Kg / 12 horas; vía subcutánea o intramuscular PORCINOS 1 mL/40 Kg / día; vía intramuscular CANINOS 0.25 – 0.5 mL/20 kg / día; vía intramuscular Intervalo entre dosis y duración del tratamiento. Intervalo entre dosis: Diario Duración de tratamiento: 3 – 5 días

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.71.01.N.0069

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Analgésicos y antipiréticos
Antibacterianos (antibioticos)
Quinolonas
Antiinflamatorios
No esteroidales sistémicos

Web Site

http://www.labodec.com/enrodeclala.html

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com