

EPRINOLINE POUR ON

Solución Tópica Pour On



Composición

Eprinomectina 0.5 g

Indicaciones

EPRINOLINE está indicado para el tratamiento y control de infecciones parasitarias causadas por formas maduras e inmaduras de nematodos gastrointestinales, nematodos pulmonares, tábanos, piojos chupadores y masticadores, ácaros Chorioptes spp., Psoroptes spp. y Sarcoptes spp.

Dosis

DOSIFICACIÓN: 1 mL cada 10 kg de peso. MODO DE APLICACIÓN:

Aplicar a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: Dosis única PERÍODO DE RETIRO: Al administrar la cantidad por la vía recomendada no se requiere tiempo de retiro para carne o leche, pero se recomienda hasta 14 días de retiro. CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: No debe administrarse por VO o IV. Los bovinos toleran por vía percutánea dosis hasta tres veces mayores de la indicada. La dosis indicada no presenta contraindicaciones ni reacciones adversas.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 120 mL, Frasco 30 mL,

Vías Administración

Topical Dérmico

Paises

Perú SENASA F.87.62.N.0103

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Antiparasitarios Internos

Gastrointestinales (nematodos)

Pulmonares – traqueales

Antiparasitarios De Uso Externo

Acaricidas

Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuchas)

Piojos

Web Site

<http://www.labodec.com/eprinoline.html#>

Labodec

