

FASIGAN FORTE

Suspensión Oral



Composición

Triclabendazol 15 g

Indicaciones

PARASITOS SUCEPTIBLES: TREMATODOS HEPATICOS: Fasciola hepática (alicuya, saguayoe, Duela de hígado) y Fasciola gigántica en sus formas adultas, juveniles y huevecillos.

Dosis

Para administración oral. BOVINOS: Administrar 12 mL por cada 100 kilos de peso corporal. Esto equivale a 10 mg de Triclabendazole por kilo de peso corporal. OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: Administrar 1 mL por cada 10 kilos de peso corporal. Esto equivale a 10 mg de Triclabendazole para cada kilo de peso corporal. PERIODO DE RETIRO: CARNE: 28 días antes del sacrificio del animal. LECHE: 12 días posteriores a la administración de producto. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: El Triclabendazole prácticamente no tiene efectos colaterales a las dosis recomendadas. Como precaución general se recomienda no administrarlo simultáneamente con antibióticos o ectoparasiticidas. También se recomienda no administrarlo a animales muy débiles o agitados debido a largas caminatas.

Presentaciones

Frasco 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 120 mL, Frasco 30 mL,

Vias Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0849

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Hepáticos (trematodos-fasciola)

Web Site

<http://www.labodec.com/fasiganforte.html>

Labodec

