

## FASIGAN PLUS 20 % + MINERALES

Labodec

### Suspensión Oral



### Composición

Albendazol 10 mg  
Cobalto 0.6 mg  
Selenio 0.3 mg  
Triclabendazol 10 mg  
Zinc 0.6 mg

### Indicaciones

FASIGAN PLUS 20% + MINERALES es sumamente efectivo contra infestaciones por los siguientes parásitos: TREMATODOS HEPATICOS: Fasciola hepática (Alicuya, Saguaype, Duela de hígado) y Fasciola gigantea en sus formas de huevecillos, juveniles y adultas. También se ha demostrado su efectividad contra la F. Magma y Paragonimus. PARARITOS REDONDOS GASTROINTESTINALES: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Trichuris spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Cooperia, etc. PARASITOS PULMONARES: Dictyocaulus viviparus. TENIAS: Moniezia expansa y Moniezia benedeni, Avitellina.

### Dosis

Únicamente para administración por vía oral. Requiere ser ligeramente agitado antes de ser dosificado. BOVINOS: Se recomienda una dosis de 12mg tanto de Triclabendazole como de Albendazole por kilo de peso corporal por una sola vez. Esto equivale a 6 mL por cada 50 kilos de peso corporal. OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: Se recomienda una dosis de 10mg tanto de Triclabendazole como de Albendazole por kilo de peso corporal. Esto equivale a 1 mL por cada 10 kilos de peso corporal. PERÍODO DE RETIRO: CARNE: 28 días, LECHE: 12 días EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: El Triclabendazole y el albendazole prácticamente no tiene efectos colaterales a las dosis recomendadas.

### Presentaciones

Frasco 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 120 mL, Frasco 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0516

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)  
Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)  
Asociados

 LABODEC

