

FASIVER

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1000 mg
Triclabendazol 20000 mg

Indicaciones

INDICACIONES: Fasiver se emplea en el tratamiento y control de los siguientes parásitos: **BOVINOS:** VERMES REDONDOS G.I.: Ostertagia Ostertagi (adultos, L4 y formas inhibidas), O. Lirata (adultos y L4), Haemonchus place (adultos y L4), Trichostrongylus axei (adultos y L4), T. Combriformis (adulto y L4), Cooperia oncophera (adultos y L4), C. Punctata (adulto y L4), C. Poctinato (adulto y L4), Oesophagostomum radiatum (adulto y L4), C. Nematodirus helveticus (adultos), N. Spathiger (adulto), Bunostomum phlebotomum (adultos). **VERMES PULMONARES:** Dictyocaulus viviparus (adulto y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), Hipoderma bovis, H. lineatum. **PIOJOS:** Linognathus vituli, Haemonchus eurysternus, Solenopotes capillatus. **ACAROS:** Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis (var. Boris). **FASCIOLA:** Adulta, juvenil, huevecillos. **OVINOS:** CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): Haemonchus contortus, Ostertagia circuncinta, O. trijurcata, Trichostrongylus axei (adultos), T. Vitrinus (adultos), T. Culobriformis, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. Venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adultos). **VERMES PULMONARES:** (adultos e inmaduros): Dictyocaulus filaria, Protostongylus rujesceus. **REZNOS NASALES(ESTROS):** Oestrus ovis

Dosis

DOSIFICACIÓN: **BOVINOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. **OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal.

PORCINOS: Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 Kilos de peso, lo que equivale a 300 mcg de Ivermectina y 6 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal.

PERÍODO DE RETIRO: Para todos los animales: Retiro de carne: 35 días antes del sacrificio del animal. Retiro de leche: 28 días. **EFFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES:**

La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación. No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto. **Tóxico:** Especialmente para peces y otras especies acuáticas.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Países

Labodec

