FASIVER

Labodec

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1000 mg
Triclabendazol 20000 mg



Indicaciones

INDICACIONES: Fasiver se emplea en el tratamiento y control de los siguientes parásitos: BOVINOS: VERMES REDONDOS G.I.: Ostertagia Ostertagi (adultos, L4 y formas inhibidas), O. Lirata (adultos y L4), Haemonchus place (adultos y L4), Trichostrongylus axei(adultos y L4), T. Combriformis (adulto y L4), Cooperia oncophera (adultos y L4), C. Punctata (adulto y L4), C. Poctinato (adulto y L4), Oesophagostomun radiatum (adulto y L4), C.Nematodirus helvetianus (adultos), N. Spathiger (adulto), Bunostomun phlebotomun (adultos). VERMES PULMONARES: Dictyocaulus viviparus (adulto y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), Hipoderma bovis, H. lineatum. PIOJOS: Linognatus vituli, Haemonchus eurysternus, Solenopotes capillatus. ACAROS: Sarcoptes scabei, Psoroptes ovis (var. Boris). FASCIOLA: Adulta, juvenil, huevecillos. OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): Haemonchus contortus, Ostertagia circuncinta, O. trijurcata, Trichostrongylus axei (adultos), T. Vitrinus (adultos), T. Culobriformis, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesphagostomum columbianum, O. Venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adultos). VERMES PULMONARES: (adultos e inmaduros): Dictyocaulus filaria, Protostongylus rujesceus. REZNOS NASALES(ESTROS):Oestrus ovis

Dosis

DOSIFICACIÓN: BOVINOS: Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. PORCINOS: Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 Kilos de peso, lo que equivale a 300 mcg de Ivermectina y 6 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. PERIODO DE RETIRO: Para todos los animales: Retiro de carne: 35 días antes del sacrificio del animal. Retiro de leche: 28 días. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación. No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto. Tóxico: Especialmente para peces y otras especies acuáticas.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Subcutáneo

Paises

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com