

## FASIVER

Solución Inyectable



### Composición

Ivermectina 1000 mg  
Triclabendazol 20000 mg

### Indicaciones

**INDICACIONES:** Fasiver se emplea en el tratamiento y control de los siguientes parásitos: **BOVINOS:** VERMES REDONDOS G.I.: *Ostertagia Ostertagi* (adultos, L4 y formas inhibidas), *O. Lirata* (adultos y L4), *Haemonchus place* (adultos y L4), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *T. Combriformis* (adulto y L4), *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *C. Punctata* (adulto y L4), *C. Pocinatus* (adulto y L4), *Oesophagostomum radiatum* (adulto y L4), *C. Nematodirus helvetianus* (adultos), *N. Spathiger* (adulto), *Bunostomum phlebotomum* (adultos). **VERMES PULMONARES:** *Dictyocaulus viviparus* (adulto y L4), *Barros* (los tres estadios pulmonares), *Hipoderma bovis*, *H. lineatum*. **PIOJOS:** *Linognathus vituli*, *Haemonchus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*. **ACÁROS:** *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis* (var. *Boris*). **FASCIOLA:** Adulta, juvenil, huevecillos. **OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *O. trijucata*, *Trichostrongylus axei* (adultos), *T. Vitrinus* (adultos), *T. Culobriiformis*, *Nematodirus filicollis*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomum columbianum*, *O. Venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis* (adultos). **VERMES PULMONARES:** (adultos e inmaduros): *Dictyocaulus filaria*, *Protostongylus rufesceus*. **REZNOS NASALES (ESTROS):** *Oestrus ovis*

### Dosis

**DOSIFICACIÓN:** **BOVINOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. **OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 50 Kilos de peso, lo que equivale a 200 mcg de Ivermectina y 4 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. **PORCINOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 Kilos de peso, lo que equivale a 300 mcg de Ivermectina y 6 mg de Triclabendazol por Kilo de peso corporal. **PERIODO DE RETIRO:** Para todos los animales: Retiro de carne: 35 días antes del sacrificio del animal. Retiro de leche: 28 días. **EFFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES:** La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación. No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto. Tóxico: Especialmente para peces y otras especies acuáticas.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

### Países

Labodec

