

## IVERPLUS 1 %

### Solución Inyectable



### Composición

Ivermectina 1000 mg

### Indicaciones

Tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos: BOVINOS: VERMES REDONOS G.I.: Ostertagia ostertagi (adultos, L4 y formas inhibidas), O. Lirata (adultos y L4), Haemonchus place (adultos y L4), Trichostrongylus axei (adultos y L4), T. Combriformis (adultos y L4), Cooperia oncophera (adultos y L4), C. punctata (adultos y L4), C poctinato (adultos y L4), Oesophagostomun radiatum (adultos y L4), Nematodirus helvetianus (adultos), N. Spathiger (adultos), Bunostomun phlebotomun (adultos). VERMES PULMONARES: Dictyocaulus viviparus (adultos y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), Hipoderma bovis, H. lineatum. PIOJOS: Linognatus vituli, Haemonchus eurysternus, Solenopotes capillatus. ACAROS: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis (var. Boris). OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): Haemonchus contortus, Ostertagia circuncinta, O. trijurcata, Trichostrongylus axei (adultos), T. vitrinus (adultos), T. culobriformis, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesphagostomun columbianum, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adultos). VERMES PULMONARES: (adultos e inmaduros): Dictyocaulus filaria, Protostongylus rujeceus. REZNOS NASALES (ESTROS): Oestrus ovis (todos los estados larvarios) ACAROS: Sarcoptes scabiei entre otros.

### Dosis

Administración parenteral, por vía subcutánea o intramuscular. BOVINOS: se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. PORCINOS: Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 kilos de peso, lo que equivale a 450 mcg por kilo de peso corporal. CANES: Se recomienda 0.1mL por cada 5 kilos de peso lo que equivale a 300 mcg por kilo de peso corporal. PERÍODO DE RETIRO: CARNES DE VACUNOS: 42 días antes del sacrificio del animal. CARNES DE PORCINOS: 42 días antes del sacrificio del animal. CARNES DE OVINOS: 42 días antes del sacrificio. LECHE: 42 días antes del consumo humano. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Paises

Labodec

