

## IVERPLUS 1 %

Solución Inyectable



### Composición

Ivermectina 1000 mg

### Indicaciones

Tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos: **BOVINOS:** VERMES REDONOS G.I.: *Ostertagia ostertagi* (adultos, L4 y formas inhibidas), *O. Lirata* (adultos y L4), *Haemonchus place* (adultos y L4), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *T. Combriformis* (adultos y L4), *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *C. punctata* (adultos y L4), *C. pockinatus* (adultos y L4), *Oesophagostomun radiatum* (adultos y L4), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *N. Spathiger* (adultos), *Bunostomun phlebotomun* (adultos). VERMES PULMONARES: *Dictyocaulus viviparus* (adultos y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), *Hipoderma bovis*, *H. lineatum*. PIOJOS: *Linognatus vituli*, *Haemonchus eurytenuis*, *Solenopotes capillatus*. ACAROS: *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis* (var. Boris). **OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *O. trijucata*, *Trichostrongylus axei* (adultos), *T. vitrinus* (adultos), *T. culobriiformis*, *Nematodirus filicollis*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomun columbianum*, *O. venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis* (adultos). VERMES PULMONARES: (adultos e inmaduros): *Dictyocaulus filaria*, *Protostongylus rufescens*. REZNOS NASALES (ESTROS): *Oestrus ovis* (todos los estados larvarios) ACAROS: *Sarcoptes scabiei* entre otros.

### Dosis

Administración parenteral, por vía subcutánea o intramuscular. **BOVINOS:** se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. **OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. **PORCINOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 kilos de peso, lo que equivale a 450 mcg por kilo de peso corporal. **CANES:** Se recomienda 0.1mL por cada 5 kilos de peso lo que equivale a 300 mcg por kilo de peso corporal. **PERÍODO DE RETIRO: CARNES DE VACUNOS:** 42 días antes del sacrificio del animal. **CARNES DE PORCINOS:** 42 días antes del sacrificio del animal. **CARNES DE OVINOS:** 42 días antes del sacrificio. **LECHE:** 42 días antes del consumo humano. **EFFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES:** La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Labodec

